

胎内市定期予防接種一覧

※対象年齢以外での接種は自費となりますのでご注意ください。

令和6年4月 改訂

| 予防接種名 | | ワクチン種類 | 対象年齢 | 標準的な接種月齢・年齢 | 接種回数 | 間隔・回数・その他 | 通知時期 | |
|--------------------------|----------------|----------------------|--|-------------------------------|---|--|--------------------|--|
| B型肝炎 | | 不活化 | 1歳未満 | 生後2か月～9か月未満 | (27日以上あけて2回、 1回目から139日以上あけて1回) 3回 | 生後1歳までに3回の接種が必要です。1回目の接種から3回目の接種を終えるまでには約半年かかります。 ※母子感染予防のために抗HBS人免疫グロブリンと併用してB型肝炎ワクチンを接種する場合は健康保険が適応されるため、定期接種の対象外となります。 | 生後2か月頃 | |
| ロタウイルス | ロタリックス (1価) | 生 (経口) | 出生6週後～24週後 | 初回接種は生後2か月～ 出生14週6日後まで | (27日以上あけて) 2回 | ワクチンの種類(1価又は5価)により、接種回数が異なります。 同じ種類のワクチンでの接種になり、接種途中での切り替えはできません。 | | |
| | ロタテック (5価) | | 出生6週後～32週後 | | (27日以上あけて) 3回 | | | |
| 小児肺炎球菌 | 初回 | 不活化 | 生後2か月～5歳未満 | (接種開始) 生後2か月～7か月未満 | (生後24か月までに27日以上あけて) 3回 | 接種開始年齢により接種回数が異なります。 生後2か月～7か月未満に接種開始：初回3回、追加1回 生後7か月～12か月未満に接種開始：初回2回、追加1回 1歳～2歳未満に接種開始：2回 2歳～5歳未満に接種開始：1回 | 生後2か月頃 | |
| | 追加 | | | 1歳～1歳3か月未満 | (初回終了後60日以上あけて1歳以降に) 1回 | | | |
| BCG(結核) | 生 | 1歳未満 | 生後5か月～8か月 | 1回 | | | | |
| ヒブ ^{※1} | 初回 | | 生後2か月～5歳未満 | (接種開始) 生後2か月～7か月未満 | (生後12か月までに27日以上あけて) 3回 | 接種開始月齢・年齢により接種回数が異なります。 生後2か月～7か月未満に接種開始：初回3回、追加1回 生後7か月～12か月未満に接種開始：初回2回、追加1回 1歳～5歳未満に接種開始：1回 | 生後2か月頃 | |
| | 追加 | | | 初回接種終了後 7か月～13か月の間隔をおく | (初回終了後7か月以上あけて) 1回 | | | |
| 5種混合 | 1期初回 | 不活化 | 生後2か月～ 7歳6か月未満 | 生後2か月～1歳 | (20日以上あけて) 3回 | 令和6年4月から、5種混合ワクチンが定期接種になります。 このワクチンは、従来の「四種混合」に「ヒブ」を加えたものとなります。 すでに、四種混合、ヒブのいずれかを接種した方は、原則5種混合の接種はできません。引き続き、四種混合、ヒブを接種してください。 | 3回目の接種月から 約1年後 | |
| | 1期追加 | | | (1期初回(3回)終了後) 1年～1年半の間隔をおく | (1期初回終了後6か月以上あけて) 1回 | | | |
| 四種混合 ^{※1} | 1期初回 | | 生後2か月～ 7歳6か月未満 | 生後2か月～1歳 | (20日以上あけて) 3回 | 四種混合、ヒブのいずれも接種していない方で、5種混合をご希望の方は、接種券を差し替えてお渡しますので、お知らせください。 | 3回目の接種月から 約1年後 | |
| | 1期追加 | | | (1期初回(3回)終了後) 1年～1年半の間隔をおく | (1期初回終了後6か月以上あけて) 1回 | | | |
| 二種混合 | 2期 | | 11歳～13歳未満 | 11歳～12歳 | 1回 | | 11歳の誕生日 | |
| 水痘 | 生 | 1歳～3歳未満 | 1回目:1歳～1歳3か月未満 2回目:1回目終了後 6か月～12か月の間隔をおく | (3か月以上あけて) 2回 | | | 7か月児健診時 | |
| 麻しん 風しん混合 (MR) | 1期 | 生 | 1歳～2歳未満 | | 1回 | 1期、2期ともに接種期間が1年しかありません。 早めに接種することをお勧めします。 | | |
| | 2期 | | 小学校入学前年度 (年度内に6歳になる者) | 当該年度内 (4月1日～3月31日) | 1回 | 年長児の4月 | | |
| 日本脳炎 | 1期初回 | 不活化 | 生後6か月～ 7歳6か月未満 | 3歳～4歳 | (6日以上あけて) 2回 | 【特例】 H7.4.2～H19.4.1生まれの方は接種回数(4回)分を20歳まで定期接種として実施可能です。 | 3歳の誕生日の前月 | |
| | 1期追加 | | | 4歳～5歳 (1期初回終了後、約1年後) | (1期初回終了後6か月以上あけて) 1回 | | | |
| | 2期 | | 9歳～13歳未満 | 9歳～10歳 | 1回 | | 9歳の誕生日 | |
| 子宮頸がん(HPV) ^{※2} | 不活化 | 小学6年生～ 高校1年生相当の女子 | 中学1年生 | 3回 | ワクチンの種類(2価、4価、9価)により、接種間隔が異なります。 | | 中学1年生になった 年度の4月 | |

※1 令和6年4月1日から、四種混合ワクチンにヒブワクチンが加わった「5種混合ワクチン」となります。

※2 子宮頸がんワクチンについては、平成25年6月からの積極的勧奨の差し控えの影響により接種機会を逃した方(H9.4.2～H20.4.1生まれの女子)は、通常の接種対象年齢を超えても令和7年3月31日まで接種可能です。

接種スケジュール

定期予防接種の標準的な接種時期を示しています。任意の予防接種を含めて実際に接種する予防接種と具体的な接種時期については、かかりつけ医にご相談ください。

: 対象年齢 ←→ : 標準的な接種月齢・年齢

| 予防接種名 | 0歳 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 1歳 | 3か月 | 6か月 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | | |
|--------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|--------------------------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| B型肝炎 | | | | ① | ② | | | | | | | ③ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロタウイルス | | | | ① | ② | (③) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小児肺炎球菌 | | | | ① | ② | ③ | | | | | | | | | | | ④ | | | | | | | | | | | | | | | |
| BCG (結核) | | | | | | | ① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒブ (インフルエンザ菌B型) | | | | ① | ② | ③ | | | | | | | | | | | ④ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5種混合 (百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ・ヒブ) | | | | ① | ② | ③ | | | | | | | | | | | ④ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四種混合 (百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ) | | | | ① | ② | ③ | | | | | | | | | | | ④ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二種混合 (ジフテリア・破傷風) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ① | | | | | | |
| 水痘 (水ぼうそう) | | | | | | | | | | | | | | | | | ① | ② | | | | | | | | | | | | | | |
| 麻しん (はしか) 風しん混合 (MR) | | | | | | | | | | | | | | | ① | | | | ② | | | | | | | 小学校就学前の1年間 (4/1~3/31) | | | | | | |
| 日本脳炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ①② | ③ | | | | | | | | | | | | | |
| 子宮頸がん (HPV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ①②③ | | | | | | |

胎内市 予防接種実施医療機関（要予約）

| 医療機関名 | 地区 | 電話番号 | 定期接種 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|---------|------|-----------|-----------|-----------------|------|-----|-----------|-----------|----|------|----|
| | | | 5種混合 | 四種混合 | 二種混合 | 麻しん風しん 混合(※) | 日本脳炎 | BCG | ヒブ | 小児肺炎球菌 | 水痘 | B型肝炎 | ロタ |
| 小野耳鼻科医院 | 大川町 | 44-3387 | | ○ 1歳以上 | ○ | ○ | ○ | | ○ 1歳以上 | ○ 1歳以上 | ○ | | ○ |
| 坂上医院 | 本町 | 43-2052 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ちの泌尿器科・内科医院 | 東本町 | 43-6334 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中条中央病院 | 西本町 | 44-8800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 橋本医院 | 東本町 | 43-2338 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はなの医院 | 築地 | 45-2008 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| わたなべ医院 | 新栄町 | 43-5955 | | | ○ 2期のみ | ○ | | | | | | | ○ |

* 麻しん風しん予防接種は通常、麻しん風しん混合（MR）ワクチンを接種しますが、麻しん単抗原・風しん単抗原ワクチンを別々に接種することも可能です。
希望する方は健康づくり課までご連絡ください。

異なるワクチンの接種間隔

