

胎内市定期予防接種一覧（こども）

※対象年齢以外での接種は自費となりますのでご注意ください。

令和7年4月 改訂

予防接種名		ワクチン種類	対象年齢	標準的な接種月齢・年齢	接種回数	間隔・回数・その他	通知時期
B型肝炎		不活化	1歳未満	生後2か月～9か月未満	(27日以上あけて2回、1回目から139日以上あけて1回) 3回	生後1歳までに3回の接種が必要です。1回目の接種から3回目の接種を終えるまでには約半年かかります。 ※母子感染予防のために抗HBs人免疫グロブリンと併用してB型肝炎ワクチンを接種する場合は健康保険が適応されるため、定期接種の対象外となります。	生後2か月頃
ロタウイルス	ロタリックス(1価)	生(経口)	出生6週後～24週後	初回接種は生後2か月～ 出生14週6日後まで	(27日以上あけて) 2回	ワクチンの種類(1価又は5価)により、接種回数が異なります。 同じ種類のワクチンでの接種になり、接種途中での切り替えはできません。	
	ロタテック(5価)		出生6週後～32週後		(27日以上あけて) 3回		
小児肺炎球菌	初回	不活化	生後2か月～5歳未満	(接種開始) 生後2か月～7か月未満	(生後24か月までに27日以上あけて) 3回	接種開始年齢により接種回数が異なります。 生後2か月～7か月未満に接種開始：初回3回、追加1回 生後7か月～12か月未満に接種開始：初回2回、追加1回 1歳～2歳未満に接種開始：2回 2歳～5歳未満に接種開始：1回	
	追加			1歳～1歳3か月未満	(初回終了後60日以上あけて1歳以降に) 1回		
BCG(結核)		生	1歳未満	生後5か月～8か月	1回		
ヒブ※1	初回	不活化	生後2か月～5歳未満	(接種開始) 生後2か月～7か月未満	(生後12か月までに27日以上あけて) 3回	接種開始月齢・年齢により接種回数が異なります。 生後2か月～7か月未満に接種開始：初回3回、追加1回 生後7か月～12か月未満に接種開始：初回2回、追加1回 1歳～5歳未満に接種開始：1回	
	追加			初回接種終了後 7か月～13か月の間隔をおく	(初回終了後7か月以上あけて) 1回		
五種混合	1期初回	不活化	生後2か月～ 7歳6か月未満	(接種開始) 生後2か月～7か月未満	(20日以上あけて) 3回	このワクチンは、従来の「四種混合」に「ヒブ」を加えたものとなります。新規接種券送付時は、五種混合でのご案内になります。 すでに、四種混合、ヒブのいずれかを接種した方は、それぞれの接種回数と同じ場合は、五種混合に切り替えることができる場合があります。	
	1期追加			(1期初回(3回)終了後) 6か月～1年半の間隔をおく	(1期初回終了後6か月以上あけて) 1回		
四種混合※1	1期初回	不活化	生後2か月～ 7歳6か月未満	生後2か月～1歳	(20日以上あけて) 3回		
	1期追加			(1期初回(3回)終了後) 1年～1年半の間隔をおく	(1期初回終了後1年以上あけて) 1回		
二種混合			11歳～13歳未満	11歳～12歳	1回		
水痘		生	1歳～3歳未満	1回目:1歳～1歳3か月未満 2回目:1回目終了後 6か月～12か月の間隔をおく	(3か月以上あけて) 2回		
麻しん 風しん混合 (MR)	1期	生	1歳～2歳未満		1回		1期、2期ともに接種期間が1年しかありません。 早めに接種することをお勧めします。
	2期		小学校入学前年度 (年度内に6歳になる者)	当該年度内 (4月1日～3月31日)	1回		
日本脳炎	1期初回	不活化	生後6か月～ 7歳6か月未満	3歳～4歳	(6日以上あけて) 2回		【特例】 H7.4.2～H19.4.1生まれの方は接種回数(4回)分を20歳まで定期接種として実施可能です。
	1期追加			4歳～5歳 (1期初回終了後、約1年後)	(1期初回終了後6か月以上あけて) 1回		
	2期		9歳～13歳未満	9歳～10歳	1回		
子宮頸がん(HPV)※2		不活化	小学6年生～ 高校1年生相当の女子	中学1年生	3回	ワクチンの種類(2価、4価、9価)により、接種間隔が異なります。	中学1年生になった 年度の4月

※1 令和6年4月1日から、四種混合ワクチンにヒブワクチンが加わった「五種混合ワクチン」となっています。

※2 子宮頸がんワクチンについては、「H9.4.2～H21.4.1生まれの女子」は、令和4年4月～7年3月末までの間に1回以上接種がある場合に限り、残りの回数を令和8年3月31日までに接種することが可能です。
(キャッチアップ接種の経過措置)

接種スケジュール

定期予防接種の標準的な接種時期を示しています。任意の予防接種を含めて実際に接種する予防接種と具体的な接種時期については、かかりつけ医にご相談ください。

■：対象年齢 ↔：標準的な接種月齢・年齢

予防接種名	0歳	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	1歳	3か月	6か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳
B型肝炎			①	②					③																					
ロタウイルス			①	②	(③)				ワクチンの種類により回数異なります。																					
小児肺炎球菌			①	②	③								④																	
BCG（結核）						①																								
ヒブ （インフルエンザ菌B型）			①	②	③								④																	
五種混合 （百日せき・ジフテリア・破傷風・ポリオ・ヒブ）			①	②	③								④																	
四種混合 （百日せき・ジフテリア・破傷風・ポリオ）			①	②	③									④																
二種混合 （ジフテリア・破傷風）																										①				
水痘（水ぼうそう）													①		②															
麻しん（はしか）風しん混合 （MR）													①							②	小学校就学前の1年間 （4/1～3/31）									
日本脳炎																		①②	③					④						
子宮頸がん（HPV）																		ワクチンの種類によりスケジュールが異なります。								①②③				

胎内市 予防接種実施医療機関（要予約）

医療機関名	地区	電話番号	定期接種												
			5種混合	4種混合	二種混合	麻しん風しん混合（※）	日本脳炎	BCG	ヒブ	小児肺炎球菌	水痘	B型肝炎	ロタ	子宮頸がん	
小野耳鼻科医院（1歳以上で接種）	大川町	44-3387			○	○	○					○			
坂上医院	本町	43-2052	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ちの泌尿器科・内科医院	東本町	43-6334	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
中条中央病院	西本町	44-8800	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
橋本医院	東本町	43-2338	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
はなの医院	築地	45-2008	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
わたなべ医院	新栄町	43-5955			○	○ 2期のみ	○							○	

※ 麻しん風しん予防接種は通常、麻しん風しん混合（MR）ワクチンを接種しますが、麻しん単抗原・風しん単抗原ワクチンを別々に接種することも可能です。希望する方は健康づくり課までご連絡ください。

異なるワクチンの接種間隔

